



Bay Area Retina Associates

Diseases and Surgery of the Retina and Vitreous

Inyecciones Oculares Para Enfermedades de la Retina

La inyección de medicamentos en el ojo o alrededor del mismo es un procedimiento muy común y bien tolerado. La inyección de medicamentos directamente en el ojo se denomina inyección intravítrea. Este es el tipo de inyección más común que se realiza en nuestras clínicas de retina. La inyección de medicamentos en el espacio que rodea al ojo se denomina inyección periocular o inyección subtenoniana, y se realiza con mayor frecuencia con esteroides.

ANESTESIA

Hay varias maneras diferentes para adormecer el ojo para una inyección. Si usted ve diferentes doctores en Bay Area Retina Associates, usted puede experimentar diferentes métodos de adormecimiento que incluyen una inyección de adormecimiento, gotas de adormecimiento, gel de adormecimiento, o un pedazo de algodón empapado con medicina de adormecimiento. Todos estos métodos son seguros y eficaces. Si usted tiene una fuerte preferencia por un estilo particular de adormecimiento, por favor hágaselo saber a su doctor de BARA.

CUIDADOS POSTERIORES

Debido a los medicamentos anestésicos que utilizamos para preparar su ojo para una inyección, su ojo permanecerá adormecido durante unos 20 minutos después de la inyección. Por favor, asegúrese de no frotar ni tocar la superficie del ojo durante este tiempo, ya que podría arañar accidentalmente la superficie del ojo y causar dolor después de que el adormecimiento desaparezca.

Evite el contacto de la superficie del ojo inyectado con el agua del lavabo o de la ducha durante 24 horas, ya que esta agua no es estéril. Le recomendamos que utilice lágrimas artificiales de venta libre con la frecuencia que desee después de la inyección, especialmente si el ojo está seco o irritado.


Si experimenta una sensación de cuerpo extraño o dolor en el ojo poco después de una inyección, debería desaparecer al día siguiente. El Tylenol y las compresas frías pueden ayudar a aliviar las molestias después de las inyecciones. Si las molestias no desaparecen al día siguiente, o si experimenta nuevas molestias durante las dos semanas posteriores a la inyección, llame a nuestra oficina.

FLOTANTES

Es común experimentar moscas volantes después de una inyección. Si ve una mancha redonda en el fondo de su visión, puede tratarse de una microburbuja de aire de la medicación que se resolverá en menos de un día. Si persiste, informe a su médico del BARA. Si ve cientos de puntos pequeños o nuevas moscas volantes en forma de telaraña en su visión, informe a su médico de BARA sin demora.

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL

Es habitual ver una mancha roja en la parte blanca del ojo después de una inyección (del color de la sangre, mientras que el resto del ojo permanece blanco), ya que los pequeños capilares suelen romperse en el momento de la inyección. Si esto ocurre, puede esperar que la mancha roja se resuelva por sí sola en varios días. Si utiliza aspirina o anticoagulantes, la mancha roja aparecerá con más frecuencia, tenderá a ser más grande y tardará más en desaparecer. Si tiene dolor o disminución de la visión, o si el ojo aparece inyectado en sangre por todas partes (como el ojo rosado), es fundamental que llame a nuestra oficina sin demora.



Una hemorragia subconjuntival (izquierda) es común después de una inyección y normalmente se resuelve por sí sola en unos pocos días, como un hematoma. Si la parte blanca del ojo tiene un aspecto de "ojo rosado", puede deberse a una irritación superficial o a algo más preocupante, sobre todo si va acompañada de dolor, sensibilidad a la luz o una disminución de la visión.



REANUDACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE GOTAS PARA LOS OJOS

Si utiliza algún colirio con receta, puede volver a utilizarlo en su horario habitual después de la inyección.

RIESGOS

después de una inyección intravítrea. Si experimenta alguno de los siguientes síntomas después de una inyección, póngase en contacto con nuestra oficina de inmediato.

- **Dolor de ojos:** una sensación de cuerpo extraño es menos preocupante que un dolor sordo
- **Disminución de la visión:** cualquier disminución de la visión en comparación con el período anterior a la inyección es preocupante
- **Sensibilidad a la luz:** el dolor ante las luces brillantes puede ser un signo de inflamación en el ojo
- **Enrojecimiento:** un aspecto de "ojo rosa" es más preocupante que una zona del color de la sangre

Si tiene dudas sobre los riesgos asociados a la inyección o a los medicamentos que se inyectan, pregunte a su médico de BARA.



Bay Area Retina Associates

Diseases and Surgery of the Retina and Vitreous

Locations

Antioch | Castro Valley | Fremont | Oakland | Pleasanton | San Leandro | Tracy | Vallejo | Walnut Creek

(800) 5-RETINA (573-8462) | www.BayAreaRetina.com

Bay Area Retina Associates es un grupo de cirujanos de retina. Todos los miembros del grupo están certificados por la Junta Americana de Oftalmología y han completado su formación en la atención médica y quirúrgica de las enfermedades de la retina. Todos los cirujanos de BARA tienen experiencia en el tratamiento de enfermedades comunes como la DMAE, la retinopatía diabética y el desprendimiento de retina, así como de enfermedades raras. Los médicos de BARA atienden a los pacientes en ocho consultorios alrededor del Este de la Bahía, una comunidad a la que hemos servido durante casi 35 años.